

Landberatung Celler Land e.V.

Fungizide in Zuckerrüben – Region Zentral-Niedersachsen

Mit dem Befall von Cercospora - Blattflecken, aber auch Ramularia - Blattflecken und vereinzelt Mehltau muss auch in diesem Jahr gerechnet werden.

Kontrollieren Sie bitte Ihre Bestände frühzeitig! Feldkontrollen sollten ab Mitte/Ende Juli erfolgen.

Als Behandlungsschwelle gilt:

bis Anfang / Mitte August

ein Befall von mehr als 5 von 100 kontrollierten Blättern

ab Mitte August

steigt die Behandlungsschwelle auf 45 befallene Blätter je 100 kontrollierten Blättern.

Ein Fungizideinsatz sollte erfolgen, wenn

- ein akuter Befall vorliegt
- keine Frührodung geplant ist (mind. 7 Wochen zwischen Behandlung und Ernte)
- intensiv beregnet wird
- im Betrieb eine enge Rübenfruchtfolge vorliegt und Probleme bereits aus Vorjahren bekannt sind
- eine Blattbergung erfolgen soll

Für eine Behandlung können die in der folgenden Tabelle dargestellten Präparate verwendet werden:

Mittel	Aufwandmenge	Wirkung gegen				Preis/ha
	l/ha kg/ha	Cercospora	Ramularia	Mehltau	Rost	
Harvesan	0,6	++	+++	++	+++	20,-€
Spyrale	1,0	+++	+++	+++	+++	35,-€
Opus	1,0	+++	+++	+++	+++	40,-€
Juwel	1,0	+++	+++	+++	+++	58,-€
Ortiva	1,0	++	++	+(+)	+++	50,-€
Score	0,4	+++	+++	+(+)	++(+)	30,-€

Die günstigen Varianten sind die erstgenannten Mittel (fett gedruckt), wobei Spyrale von der Breitenwirkung etwas besser eingestuft ist.